

核准日期：2018年09月04日

修订日期：2019年02月11日、2020年06月01日、2023年05月25日、2024年12月25日

BIOHUI®

博晖生物



【用法用量】 口服。每次在进餐时，每次分次服用。

【不良反应】 本品可能引起过敏反应，严重者可发生过敏性休克。用药期间应密切观察病情变化，一旦出现过敏反应或其他严重不良反应，应停药并及时就医。

【禁忌】 对本品或本品中任何成分过敏者禁用。

【注意事项】 1. 本品为处方药，应在医生指导下使用。2. 本品可能引起嗜睡，服药期间应避免驾驶车辆或操作机械。3. 本品可能引起便秘，长期服用时应注意饮食调节。4. 本品可能引起口干，服药期间应多喝水。5. 本品可能引起头晕，服药期间应避免饮酒。6. 本品可能引起皮疹，一旦出现皮疹应立即停药并就医。7. 本品可能引起心悸，服药期间应避免剧烈运动。8. 本品可能引起失眠，服药期间应避免使用兴奋剂。9. 本品可能引起食欲不振，服药期间应注意营养均衡。10. 本品可能引起体重增加，长期服用时应注意体重监测。

【规格】 每盒装 30 片。

【包装】 本品采用铝塑包装，每盒装 30 片。

【有效期】 36 个月。

【贮藏】 密封，避光，室温保存。

【批准文号】 国药准字 H200801003。

【生产企业】 博腾生物制药（河北）有限公司。

【注册地址】 河北省石家庄市高新区天山大街 100 号。

【邮政编码】 050200。

【电话号码】 0311-83935518。

【药物相互作用】 本品与中枢神经系统抑制剂合用，可增加嗜睡作用。本品与抗凝剂合用，可增加出血风险。本品与利尿剂合用，可增加电解质紊乱风险。本品与降压药合用，可增加降压作用。本品与降糖药合用，可增加低血糖风险。本品与免疫抑制剂合用，可增加感染风险。本品与化疗药合用，可增加骨髓抑制风险。本品与麻醉药合用，可增加呼吸抑制风险。本品与镇静剂合用，可增加镇静作用。本品与抗胆碱药合用，可增加口干、便秘等副作用。本品与抗酸药合用，可能影响本品吸收。本品与益生菌合用，可能影响本品疗效。本品与酒精合用，可能加重肝脏负担。本品与烟草合用，可能影响本品代谢。本品与避孕药合用，可能影响避孕效果。本品与避孕药合用，可能影响避孕效果。本品与避孕药合用，可能影响避孕效果。

【药物过量】 本品过量服用可引起严重不良反应，应立即停药并就医。